

Botulinumtoxin Typ-A (Botox)

VORSORGE

1 Woche vor der Behandlung:

- **Keine** Blutverdünnenden Medikamente einnehmen wie z.B. Aspirin, Ibuprofen, Fischöl etc.

1 Tag vor der Behandlung:

- **Kein** Alkohol, Koffein oder Teein konsumieren wie z.B. Energydrinks, Redbull, CocaCola, IceTee etc.

Am Tag der Behandlung:

- **Ungeschminkt** zur Behandlung kommen - wenn möglich
- Etwas **essen und trinken**.

* Falls du bereits einmal Herpes hattest, empfehlen wir dir prophylaktisch sowie nach der Behandlung antivirale Medikamente (z.B. Valtrex) einzunehmen um so einen weiteren Herpesausbruch und damit verbundene Wundheilungsstörungen vorzubeugen.

NACHSORGE

Während 4h folgende Punkte beachten:

- **Nicht** die behandelte Zone berühren
- **Nicht** flach hinlegen -> Kopf aufrecht halten
- **Nicht** kopfüber bücken -> Kopf aufrecht halten
- **Nicht** rauchen

Während 48h folgende Punkte beachten:

- **Kein** Kontakt mit nicht-desinfizierten/sterilen Flächen wie z.B. Hände, Handy etc.
- **Kein** Make-Up
- **Keinen** Druck ausüben wie z.B. mit Motorradhelm oder Cap/Hut
- **Kein** Sport/Schwimmen/Baden
- **Keine** Hitze wie z.B. heisses Duschwasser, direkte Sonneneinstrahlung, Solarium, Sauna etc.

Während 2 Wochen folgende Punkte beachten:

- **Keine** Massagen oder Druckausübungen der behandelten Zone/-n
- **Keine** Laserbehandlung der behandelten Zone/-n

Bitte beachte, dass die Botox Nachbehandlung **innerhalb von 10 bis 14 Tagen kostenlos** ist.

Besonders bei Neukundinnen und Neukunden ist es wichtig zu kontrollieren ob die angewendete Dosierung und Injektionstechnik gepasst hat und falls nötig nachgestochen werden muss.

NICHT GEEIGNETE PERSONEN

- Personen unter 18 Jahren
- Schwangere oder sich in der Stillzeit befindende Personen
- Personen mit einer akuten/chronischen Erkrankung (z.B. Grippe, Erkältung)
- Personen mit einer akuten Entzündung/Hauterkrankung an der zu behandelnden Zone (z.B. Herpes, Akne, Ekzeme)
- Personen mit Unverträglichkeit/Allergie auf Produktbestandteile (z.B. Albumin)
- Personen die an Myasthenia Gravis, Myopathie, Lambert Eaton Syndrom leiden
- Personen die aminoglykosidhaltige Antibiotika einnehmen (z.B. Gentamycin, Neomycin)

RISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN

- Schwellung/Anhebung und Rötung an den Einstichlöchern durch Kochsalzlösung (ca. 30min)
- Rötungen, Schwellungen und Blutergüsse
- Kopfschmerzen und Spannungsgefühl
- Asymmetrien (selten)
- Herpesausbruch (selten) - Bei Herpesausbruch sofort antivirale Medikamente (z.B. Valtrex) einnehmen.
- Leichtes Kribbeln/Taubheitsgefühl (sehr selten)
- Infektionen (sehr selten)
- Allergische/Anaphylaktische Reaktion (sehr selten)
- Ptosis nach Zornesfalten und/oder Augenbrauen Botox (sehr selten)
- Eyebrow Drop nach Stirn und/oder Zornesfalten Botox
- Einschränkung in Aussprache und im starken Schliessen der Lippen nach Lipflip Botox.

Achtung, dies ist keine vollständige Liste. Holen Sie sich sofort medizinische Hilfe, wenn Sie Anzeichen einer allergischen Reaktion haben: Nesselsucht, Schwierigkeiten beim Atmen, Schwellung von Gesicht, Lippen, Zunge, Rachen oder anderen Körperbereichen.

Zögern Sie nicht ihren behandelnden Arzt zu kontaktieren und melden Sie sich ausserhalb der Telefonzeiten direkt bei folgenden Nummern:

Ärztefon Zürich: 0800 33 66 55

Notfallnummer: 144 (Bei akuter Lebensgefahr)