

Vor- und Nachsorge PDF

BOTULINUMTOXIN TYP-A
VISTABEL®

BEHANDLUNGSABLAUF

1. Vorbesprechung
2. Reinigung und Desinfektion der Behandlungszonen
3. Genaue Markierung der Injektionspunkte
4. Injektion des Botulinumtoxins Typ-A mit einer sehr feinen Nadel
5. Reinigung der behandelten Zonen
6. Besprechung der Nachsorge für Zuhause

VORSORGE

Auf S.3 den Abschnitt "Nicht geeignete Personen" im PDF aufmerksam durchlesen. Falls einer oder mehrere Punkte zutreffen, den Termin frühzeitig annullieren siehe AGB's.

- 1 Woche vorher keine Blutverdünnenden Medikamente/Supplemente einnehmen wie z.B. Aspirin, Ibuprofen, Fischöl etc.
- 1 Tag vorher kein Alkohol, Koffein oder Teein konsumieren wie z.B. Energydrinks, Redbull, CocaCola, IceTee, Kaffee, Matcha etc.
- Bei einer Behandlung im Gesichtsbereich wenn möglich ungeschminkt kommen
- Am Tag der Behandlung vorher etwas essen

NACHSORGE

- 4h die behandelten Zonen nicht berühren
- 4h nicht flach hinlegen oder kopfüber bücken -> nur nach Stirn, Zornesfalte, Krähenfüsse und/oder Augenbrauenlift
- Während 2 Wochen keinen Druck auf die behandelten Zonen (z.B. Cap, Helm, Stirnband, Massagen, Küssen nach Lipflip)

- 24h kein Make-Up
- 24h kein Lippenbalm nach Lipflip
- 48h nicht rauchen
- 48h keinen Sport, Schwimmen und/oder Baden
- 48h keine direkte Hitze (z.B. heisses Duschwasser, direkte Sonneneinstrahlung, Solarium, Sauna, Dampfbad)
- Während zwei Wochen keine Laser- und/oder kosmetische Behandlungen der behandelten Zone/-n.

Bitte beachte, dass die Botox Nachbehandlung **innerhalb von 10 bis 14 Tagen kostenlos** ist. Melde dich also spätestens am 10. Tag um einen Nachkontrolltermin in diesem Zeitfenster zu vereinbaren.

Besonders bei Neukundinnen und Neukunden, wie auch bei der Behandlung der Stirn ist es uns wichtig zu kontrollieren ob die erstmalige Dosierung gepasst hat und falls nötig nachgestochen werden muss.

NICHT GEEIGNETE PERSONEN

- Personen unter 18 Jahren
- Schwangere oder sich in der Stillzeit befindende Personen
- Personen mit Nadelphobie
- Personen die an Anaphylaxie leiden
- Personen die Hyaluron Filler in der zu behandelnden Zone hatten/haben. -> Muss zum Teil vorab aufgelöst werden
- Personen die bereits Biopolymer (Aquafilling) oder Silikoninjektionen in der zu behandelnden Zone hatten
- Personen mit einer akuten Entzündung/Hauterkrankung an der zu behandelnden Zone (z.B. Akne, Ekzeme, Hautausschlag)
- Personen mit einer akuten und/ oder chronischen Erkrankung (z.B. Grippe, Neurodermitis) -> Gibt einige Ausnahmen
- Personen mit einer akuten und/oder abheilenden Herpesinfektion
- Personen die Antibiotika einnehmen -> Gibt einige Ausnahmen
- Personen mit Unverträglichkeit/Allergie auf Produktbestandteile (z.B. Botulinumtoxin Typ- A, Albumin, Natriumchlorid)

RISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN

- Kleine Schwellungen/Anhebungen bei den Einstichstellen durch Kochsalzlösung für ca. 15-30min
- Rötungen, Schwellungen und Blutergüsse
- Kopfschmerzen und Spannungsgefühl

- Leichtes Kribbeln und Taubheitsgefühl - temporär
- Nach Lipflip/Lippenfalten BTX ca. 1-2 W. u.a. eingeschränkt beim: Pfeiffen, aus dem Rörchen trinken, Zähne spülen - temporär
- Asymmetrien -> wenn möglich kostenlose Korrektur innerhalb von 10-14 Tagen nach der Behandlung - temporär
- Nach Lipflip/Lippenfalten Botox Asymmetrien und sichtbar werden von altem Hyaluron Filler - temporär
- Augenlidschwellung (selten) - temporär
- Augenbrauen Drop (selten) - temporär
- Ptosis (sehr selten) - temporär

- Herpesausbruch (sehr selten)
- Infektionen (sehr selten)
- Allergische/Anaphylaktische Reaktion (sehr selten)

Dies sind nur die häufigsten Risiken und Nebenwirkungen, also keine vollständige Liste. Holen Sie sich sofort medizinische Hilfe, wenn Sie Anzeichen einer allergischen Reaktion haben, wie z.B. Schwierigkeiten beim Atmen, plötzlich starke Schwellung von Gesicht, Lippen, Zunge, Rachen oder anderen Körperbereichen.

Zögern Sie nie skkins zu kontaktieren und melden Sie sich ausserhalb der Telefonzeiten direkt bei folgenden Nummern:

Ärztetelefon Zürich: 0800 33 66 55

Notfallnummer: 144 (Bei akuter Lebensgefahr)